



Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Indicador	Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo
Descrição	Proporção (%) de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) Base demográfica do Ministério da Saúde Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
Método de Cálculo	Número de crianças com esquema básico completo na idade-alvo para determinado tipo de vacina / Número de crianças na idade alvo * 100
Categorização	Região, tipo de vacina
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2000-2009
Notas	

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração: 30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Como citar Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2012 Jan 30 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Ind030203-20120130.pdf>

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Período:2000-2009

Região/Imunobiológico	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Região Norte										
Tetraivalente/DPT	78,1	87,9	92,1	96,4	92,4	91,7	104,1	105,2	100,2	98,4
Poliomielite	105,9	105,9	107,8	105,9	98,4	95,5	107,8	106,6	103,5	100,8
BCG	111,7	119,1	119,1	115,2	107,0	115,1	131,6	127,2	122,2	115,3
Hepatite B	72,2	80,3	82,6	83,2	84,1	85,3	100,0	100,2	98,2	97,5
Tríplice viral	100,2	113,1	108,7	96,5	108,9	111,4	108,6	105,4
Região Nordeste										
Tetraivalente/DPT	89,9	96,3	98,9	97,9	94,0	93,8	104,1	106,4	101,8	102,7
Poliomielite	97,2	103,7	99,1	100,0	96,2	96,1	106,0	108,3	102,4	103,0
BCG	114,3	117,6	113,8	111,7	108,5	107,6	115,7	117,5	110,9	108,6
Hepatite B	85,7	90,9	91,6	92,4	88,5	89,2	100,1	102,2	98,9	100,2
Tríplice viral	91,0	111,8	107,7	100,7	104,8	109,4	104,5	105,4
Região Sudeste										
Tetraivalente/DPT	99,8	98,7	98,6	95,7	96,5	95,6	97,5	99,3	95,6	97,6
Poliomielite	102,1	100,8	98,4	98,8	97,7	98,6	98,8	102,2	98,8	100,2
BCG	110,7	107,9	106,2	104,8	104,3	103,3	103,9	104,1	104,3	102,6
Hepatite B	98,2	93,8	92,4	92,7	91,8	93,2	95,7	97,2	94,7	97,0
Tríplice viral	101,6	114,9	103,6	99,0	100,0	101,1	97,8	99,2
Região Sul										
Tetraivalente/DPT	101,3	102,7	100,7	100,4	98,4	99,5	98,0	101,8	94,5	96,8
Poliomielite	101,3	102,8	98,4	100,2	98,0	99,3	97,6	101,5	94,8	96,8
BCG	106,9	107,6	104,8	104,3	103,5	103,7	99,1	101,5	100,7	99,7
Hepatite B	97,0	97,9	95,7	96,6	93,7	95,9	94,5	98,7	92,5	95,2
Tríplice viral	93,7	110,3	99,4	99,2	97,8	99,1	97,5	97,7
Região Centro-Oeste										
Tetraivalente/DPT	97,1	100,2	102,1	101,9	104,2	99,7	100,7	107,9	101,0	102,5
Poliomielite	110,7	105,7	104,2	104,1	106,0	102,7	102,6	108,3	102,3	103,3
BCG	116,0	115,8	113,9	110,9	113,0	110,6	107,7	114,0	112,5	110,0
Hepatite B	88,9	91,9	91,7	92,2	93,1	92,4	96,6	103,3	97,5	100,0
Tríplice viral	98,5	112,4	105,0	105,4	102,1	107,2	102,8	102,3
Brasil										
Tetraivalente/DPT	94,7	97,5	98,6	97,5	96,1	95,4	100,5	103,1	98,2	99,5

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Período:2000-2009

Região/Imunobiológico	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Poliomielite	101,4	102,8	100,0	100,5	97,9	97,8	102,0	104,9	100,1	100,9
BCG	111,7	112,6	110,3	108,5	106,4	106,5	110,0	111,1	108,4	106,0
Hepatite B	91,1	91,9	91,5	92,0	90,3	91,3	97,4	99,7	96,3	98,0
Tríplice viral	96,9	113,0	105,0	99,7	102,2	104,9	101,3	101,8

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).
7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração: 30/01/2012
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Tetraivalente/DPT

Período:2000-2009





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico Tetraivalente/DPT

Período:2000-2009



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetraivalente (DTP + Hib).

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico Tetravalente/DPT

Período:2000-2009

7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração:

30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Poliomielite

Período:2000-2009





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico Poliomielite

Período:2000-2009



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Poliomielite

Período:2000-2009

7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração:

30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

BCG



Período:2000-2009



Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico BCG



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)
Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico BCG

7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração:

30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Hepatite B

Período:2000-2009





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico Hepatite B

Período:2000-2009



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico Hepatite B

Período:2000-2009

7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração:

30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Tríplice viral

Período:2000-2009





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Tríplice viral

Período:2000-2009



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em determinados grupos populacionais.
2. A demanda da população não residente aos postos de vacinação, principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal.
3. A população-alvo utilizada para cálculo das coberturas vacinais é derivada da Base demográfica do Ministério da Saúde e/ou do Sistema de Informações sobre Nascidos vivos. Para detalhes do cálculo da população alvo, recomenda-se a leitura das Notas Técnicas do SI-PNI (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/pni/cpnidescr.htm#pop>).
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. A vacina tríplice viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola), aplicada em crianças de 1 ano, foi adotada como parte do Programa Nacional de Imunizações a partir de 2002, substituindo a vacina contra sarampo, aplicada em crianças menores de 1 ano.
6. Até 2002, está contabilizada a cobertura da vacina tríplice bacteriana (DPT); a partir de 2003, esta vacina foi substituída pela Tetravalente (DTP + Hib).

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203 - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo região e tipo de imunobiológico

Tríplice viral

Período:2000-2009

7. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Elaboração:

30/01/2012

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ