



Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

| | |
|----------------------|--|
| Indicador | Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais |
| Descrição | Número de óbitos por homicídios, por 100 mil habitantes, na população residente de 15 anos e mais, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. |
| Fonte | Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) Base demográfica do Ministério da Saúde |
| Método de Cálculo | $\text{Número de óbitos de residentes de 15 anos ou mais por homicídios} / \text{População residente de 15 anos ou mais} * 100.000$ |
| Categorização | Região metropolitana, escolaridade |
| Periodicidade | Anual |
| Períodos disponíveis | 2001-2009 |
| Notas | |

1. Como homicídios, foram considerados os códigos X85-Y09 (agressões) e Y35-Y36 (intervenções legais) da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Em alguns estados e em alguns anos, o número de óbitos por causas externas com intenção indeterminada (Y10-Y34) é proporcionalmente grande, diminuindo o número de óbitos por homicídios.

Data de elaboração 31/03/2013
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Como Citar Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2013 Mar 31 [data de acesso com a expressão "acesso em"]. Disponível em: <http://dssbr.org/site/wp-content/uploads/2013/04/Ind020211RM-20130331.pdf>

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

| Região/Escolaridade | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Belém | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 45,2 | 64,4 | 58,2 | 72,7 | 75,6 | 83,3 | 76,0 | 106,3 | 78,6 |
| 4 a 7 anos | 46,2 | 56,7 | 66,2 | 71,4 | 107,0 | 107,8 | 106,6 | 171,4 | 164,3 |
| 8 anos e mais | 11,0 | 10,1 | 13,2 | 12,4 | 19,6 | 19,8 | 19,3 | 30,8 | 31,1 |
| Total | 26,9 | 32,5 | 35,5 | 38,4 | 50,5 | 51,4 | 47,8 | 71,1 | 68,4 |
| % óbitos s/escolarid | 53,0 | 18,0 | 5,7 | 3,3 | 9,2 | 12,8 | 14,6 | 6,3 | 10,7 |
| Fortaleza | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 70,5 | 91,8 | 91,9 | 85,4 | 102,1 | 115,9 | 114,2 | 94,0 | 92,2 |
| 4 a 7 anos | 41,5 | 36,7 | 48,1 | 48,8 | 52,1 | 54,8 | 72,2 | 90,9 | 92,1 |
| 8 anos e mais | 7,3 | 9,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 13,1 | 13,9 | 14,4 | 14,7 |
| Total | 32,9 | 36,2 | 39,5 | 37,0 | 40,7 | 42,9 | 46,5 | 45,3 | 44,8 |
| % óbitos s/escolarid | 68,6 | 48,3 | 57,1 | 47,9 | 38,1 | 35,8 | 42,5 | 41,6 | 41,4 |
| Recife | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 318,8 | 227,7 | 238,0 | 129,6 | 195,1 | 153,4 | 76,9 | 110,1 | 104,8 |
| 4 a 7 anos | 73,4 | 104,2 | 115,6 | 159,3 | 168,0 | 172,8 | 222,6 | 186,0 | 162,9 |
| 8 anos e mais | 34,8 | 26,1 | 28,9 | 45,2 | 21,4 | 36,9 | 32,4 | 32,2 | 29,9 |
| Total | 108,1 | 92,2 | 97,8 | 93,1 | 93,7 | 94,3 | 87,9 | 81,8 | 71,2 |
| % óbitos s/escolarid | 93,8 | 93,0 | 90,4 | 81,6 | 84,0 | 78,3 | 49,8 | 16,4 | 12,1 |
| Salvador | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 56,4 | 57,2 | 83,8 | 84,9 | 129,9 | 174,4 | 131,8 | 184,2 | 189,7 |
| 4 a 7 anos | 39,1 | 58,3 | 66,9 | 71,9 | 95,8 | 111,3 | 141,0 | 168,5 | 172,9 |
| 8 anos e mais | 5,6 | 5,2 | 9,8 | 10,1 | 14,5 | 11,8 | 20,9 | 29,7 | 25,2 |
| Total | 24,3 | 28,4 | 37,3 | 37,9 | 52,4 | 57,4 | 62,6 | 78,6 | 79,9 |
| % óbitos s/escolarid | 6,2 | 8,2 | 5,2 | 2,6 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 2,9 |
| Belo Horizonte | | | | | | | | | |

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

| Região/Escolaridade | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0 a 3 anos | 76,2 | 84,7 | 98,2 | 103,6 | 97,5 | 81,6 | 62,1 | 59,3 | 38,6 |
| 4 a 7 anos | 67,9 | 91,4 | 131,8 | 153,9 | 130,2 | 126,9 | 110,4 | 109,3 | 97,5 |
| 8 anos e mais | 14,9 | 18,0 | 26,6 | 32,5 | 29,0 | 27,2 | 30,4 | 24,7 | 24,8 |
| Total | 41,6 | 50,6 | 68,4 | 76,4 | 65,9 | 60,4 | 55,7 | 49,9 | 43,9 |
| % óbitos s/escolarid | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
| Rio de Janeiro | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 114,5 | 141,8 | 144,8 | 113,9 | 106,1 | 95,4 | 77,7 | 68,3 | 57,3 |
| 4 a 7 anos | 104,1 | 120,1 | 123,5 | 133,3 | 134,5 | 133,8 | 118,1 | 104,3 | 93,5 |
| 8 anos e mais | 29,4 | 34,4 | 32,5 | 31,2 | 27,0 | 30,5 | 25,6 | 20,3 | 18,9 |
| Total | 64,0 | 74,5 | 72,8 | 68,8 | 64,1 | 62,9 | 51,7 | 43,4 | 39,6 |
| % óbitos s/escolarid | 26,5 | 25,0 | 21,6 | 15,7 | 13,2 | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 4,5 |
| São Paulo | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 129,6 | 112,6 | 94,1 | 76,1 | 52,1 | 52,0 | 37,2 | 37,2 | 33,5 |
| 4 a 7 anos | 146,4 | 144,1 | 140,7 | 107,8 | 73,9 | 63,1 | 49,0 | 52,3 | 46,8 |
| 8 anos e mais | 29,6 | 26,1 | 28,4 | 23,5 | 20,8 | 22,1 | 16,4 | 14,4 | 15,8 |
| Total | 78,0 | 70,8 | 65,9 | 50,8 | 37,7 | 35,1 | 25,7 | 24,9 | 24,1 |
| % óbitos s/escolarid | 14,4 | 12,9 | 11,6 | 12,1 | 13,1 | 19,4 | 16,0 | 16,7 | 15,1 |
| Curitiba | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 84,7 | 113,6 | 103,0 | 114,7 | 96,3 | 90,9 | 80,2 | 87,0 | 109,4 |
| 4 a 7 anos | 40,2 | 47,1 | 73,9 | 91,2 | 119,1 | 119,5 | 111,9 | 147,9 | 157,2 |
| 8 anos e mais | 14,6 | 12,5 | 20,4 | 20,9 | 21,9 | 25,4 | 21,5 | 29,8 | 34,6 |
| Total | 34,4 | 37,7 | 46,5 | 51,0 | 55,1 | 56,1 | 50,4 | 62,4 | 69,0 |
| % óbitos s/escolarid | 15,6 | 4,4 | 5,7 | 5,5 | 11,5 | 10,4 | 7,0 | 5,7 | 5,1 |
| Porto Alegre | | | | | | | | | |
| 0 a 3 anos | 117,5 | 118,9 | 143,5 | 159,8 | 165,2 | 138,4 | 147,4 | 155,7 | 148,6 |

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

| Região/Escolaridade | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 a 7 anos | 35,0 | 46,7 | 44,1 | 44,6 | 50,1 | 44,8 | 59,0 | 68,4 | 61,7 |
| 8 anos e mais | 12,6 | 9,9 | 9,0 | 9,3 | 7,2 | 12,2 | 14,7 | 16,4 | 15,0 |
| Total | 34,7 | 36,6 | 37,1 | 38,2 | 38,1 | 35,7 | 42,2 | 46,8 | 41,6 |
| % óbitos s/escolarid | 63,7 | 67,9 | 70,5 | 67,9 | 73,1 | 67,7 | 70,3 | 65,8 | 65,2 |

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como homicídios, foram considerados os códigos X85-Y09 (agressões) e Y35-Y36 (intervenções legais) da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Em alguns estados e em alguns anos, o número de óbitos por causas externas com intenção indeterminada (Y10-Y34) é proporcionalmente grande, diminuindo o

Data de elaboração: 31/03/2013










CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009



Situação de saúde

Indicadores de mortalidade por causas

Ind020211RM - Taxa de mortalidade específica por homicídios na população de 15 anos e mais, por ano, segundo região metropolitana e escolaridade

Período:2001-2009

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Notas:

1. Como homicídios, foram considerados os códigos X85-Y09 (agressões) e Y35-Y36 (intervenções legais) da CID-10.
2. O grande número de casos sem informações sobre escolaridade limita as análises do indicador. Estes casos foram distribuídos proporcionalmente pelas demais faixas de escolaridade.
3. Há problemas de cobertura do SIM em determinadas áreas geográficas, principalmente no Norte e Nordeste; há tendência que os dados não registrados sejam de pessoas de baixa instrução, o que aumentaria a proporção dos mesmos.
4. Foi adotada a população de 15 anos e mais para diminuir o efeito da baixa escolaridade de crianças.
5. A distribuição da população segundo a escolaridade foi efetuada aplicando-se a distribuição encontrada nas PNAD sobre a Base demográfica do Ministério da Saúde.
6. Em alguns estados e em alguns anos, o número de óbitos por causas externas com intenção indeterminada (Y10-Y34) é proporcionalmente grande, diminuindo o

Data de elaboração: 31/03/2013

CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ