



Portal Determinantes Sociais da Saúde  
Observatório sobre Iniquidades em Saúde  
CEPI-DSS/ ENSP/ FIOCRUZ

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

### **Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

Indicador	Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo
Descrição	Proporção (%) de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, em determinado espaço geográfico, no ano considerado
Fonte	Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) Base demográfica do Ministério da Saúde
Método de Cálculo	Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos Número de crianças com esquema básico completo na idade-alvo para determinado tipo de vacina / Número de crianças na idade alvo * 100
Categorização	Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico
Periodicidade	Anual
Períodos disponíveis	2000-2012
Notas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.</li><li>2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.</li><li>3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetralente (DTP + Hib) substitui as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.</li><li>4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.</li><li>5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.</li></ol>
Data de elaboração	13/12/2016 CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ
Como Citar	Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico [Internet]. Rio de Janeiro: Portal Determinantes Sociais da Saúde. Observatório sobre Iniquidades em Saúde. CEPI-DSS/ENSP/FIOCRUZ; 2016 dez. 13. Disponível em: <a href="http://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Ind030203RN-20161213.pdf">http://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Ind030203RN-20161213.pdf</a>

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

Período:2000-2010

Região/ Imunobiológico	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Brasil</b>													
Tetraivalente/DTP	94,71	97,45	98,55	97,47	102,41	102,82	103,5	103,25	97,98	99,5	98,01	99,61	93,81
Poliomielite	101,44	102,83	100,01	100,48	104,3	105,12	105,25	105,43	100,18	100,92	99,35	101,33	96,55
BCG	111,74	112,6	110,28	108,47	113,36	114,48	113,06	111,08	108,91	105,98	106,71	107,94	105,69
Hepatite B	91,08	91,88	91,47	92	96,26	98,46	100,3	99,89	96,06	98	96,08	97,71	96,67
Tríplice viral/sarampo	105,35	103,85	96,02	112,95	110,93	106,55	105,35	106,8	99,81	101,8	99,93	102,39	99,5
<b>Região Norte</b>													
Tetraivalente/DTP	78,13	87,85	92,14	96,39	104,22	105,49	103,27	105,31	98,15	98,41	98,36	95,96	91,12
Poliomielite	105,9	105,86	107,77	105,89	110,96	109,83	106,91	106,64	101,2	100,82	99,29	97,91	96
BCG	111,66	119,05	119,11	115,16	120,65	132,45	130,46	127,23	120,07	115,26	117,45	115,7	113,64
Hepatite B	72,21	80,33	82,59	83,23	94,93	98,14	99,24	100,34	96,17	97,5	97,11	95,05	93,63
Tríplice viral/sarampo	109,61	113,45	100,72	113,08	122,27	110,21	107,95	113,47	105,13	105,42	104,02	102,4	100,32
<b>Rondônia</b>													
Tetraivalente/DTP	102,56	104,5	98,5	92,78	103,39	108,7	120,48	122,04	107,81	112,01	102,64	106,95	103,97
Poliomielite	98,82	104,77	98,27	93,97	103,75	110,25	122,13	120,88	105,98	109,01	101,2	107,32	105,68
BCG	111,6	114,36	102,43	97,42	106,6	109,69	121,15	114,13	105,86	104	102,79	105,79	106,12
Hepatite B	94,53	98,9	92,68	86,75	94,16	101,9	114,1	113,45	100,19	103,84	98,73	101,35	102,76
Tríplice viral/sarampo	100,63	103,37	96,17	115,24	130,63	115,99	125,36	116,7	103,49	99,56	100,41	102,72	105,4
<b>Acre</b>													
Tetraivalente/DTP	65,06	79,12	97,3	104,58	86,59	89,71	88,14	102,03	88,35	93,94	92,41	96,95	87,57
Poliomielite	92,64	113,91	122,35	131,65	111,35	94,05	94,66	116,33	94,64	103,9	104,03	111,03	96,07
BCG	112,32	134,96	132,91	121,07	116,13	110,46	116,02	122,55	108,57	101,11	114,23	109,63	105
Hepatite B	60,72	77,99	84,91	94,58	83,24	82,15	85,93	101,72	88,3	91,18	93,29	93,78	90,68
Tríplice viral/sarampo	94,22	96,8	80,08	99,4	123,22	95,12	90,84	109,45	94,17	96,91	96,87	105,29	90,28
<b>Amazonas</b>													
Tetraivalente/DTP	74,81	72,37	72,21	76,79	88,5	92,16	91,34	94,78	90,15	97,41	94,17	91,25	93,26
Poliomielite	103,46	90	91,89	85,63	91,44	90,97	89,85	93,06	87,06	94,18	92,48	87,15	91,93
BCG	118,46	108,31	107,78	109,89	118,64	130,49	127,52	125,35	121,18	120,62	115,98	117,27	124,16
Hepatite B	64,57	66,13	66,06	68,57	77,6	85,09	86,34	91,82	86,98	94,33	92,73	90,33	93,98
Tríplice viral/sarampo	113,34	94,82	84,27	91,3	86,06	104,03	103,37	110,07	101,56	103,75	100,11	94,67	103,39
<b>Roraima</b>													
Tetraivalente/DTP	128,99	81,27	95,86	84,51	85,92	95,9	89,81	92,05	86,71	100,22	95,49	95,91	81,44

## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

Período:2000-2010

Poliomielite	134,1	85,58	93,31	86,46	91,02	100,22	90,94	95	89,57	98,71	96,71	95,52	88,78
BCG	187,41	104,68	116,91	105,42	97,5	107,16	115,45	103,53	95,06	96,09	113,21	115,06	118,08
Hepatite B	122,9	77,19	85,19	78,41	80,64	87,62	84,8	88,46	81,84	94,47	90,85	93,31	84,34
Tríplice viral/sarampo	135,75	84,9	93,31	110,22	110,32	116,01	94,23	97,31	95,51	95,95	94,49	97,98	87,83
Pará													
Tetraivalente/DTP	68,19	83,93	98,56	106,47	116,01	115,02	109,03	109,55	102,06	95,86	101,35	96,13	89,41
Poliomielite	109,25	107,74	118,45	118,52	124,94	123,42	116,22	111,15	109,56	99,97	103,38	101,54	97,78
BCG	103,54	118,34	127,04	122,87	128,59	146,91	140,16	136,53	127,68	120,86	124,65	120,12	113,62
Hepatite B	63,75	73,64	85,5	86,5	105,25	106,42	105,3	103,32	102,19	98,3	100,64	96,71	93,35
Tríplice viral/sarampo	111,86	124,3	116,86	124,98	143,1	116,35	113,05	118,49	111,83	110,91	110,95	109,25	102,2
Amapá													
Tetraivalente/DTP	85,73	156,41	94,77	93,92	96,28	96,39	92,58	95,99	98,37	98,57	93,43	89,94	87,16
Poliomielite	91,16	155,06	94,27	98,44	104,02	99,7	94,36	98,82	97,1	119,34	90,75	84,58	92,67
BCG	117,68	181,41	129,05	123,55	121,2	123,56	121,68	113,26	115,66	109,4	115,69	111,74	105,8
Hepatite B	87,62	156,27	90,72	86,5	89,8	91,32	90,84	89,91	91,22	95,34	90,14	88,48	87,77
Tríplice viral/sarampo	97,78	163,82	54,55	114,5	129,76	99,34	90,41	98,29	93,02	95,19	92,1	93	91,55
Tocantins													
Tetraivalente/DTP	100,46	106,32	100,27	100,53	105,75	105,36	108,74	108	99,57	104,41	97,45	100,63	89,38
Poliomielite	106,04	118,44	106,54	102,04	106,65	106,26	108,91	109,02	99,83	104,43	97,21	99,62	92,75
BCG	110,23	122,08	113,06	102,09	109,27	110,81	111,61	109,12	107,3	99,28	100,84	102,6	98,29
Hepatite B	94,71	100,11	95,97	96,67	102,12	102,76	105,93	105,1	97,43	102,36	97,54	98,55	93,49
Tríplice viral/sarampo	102,88	108,37	98,91	115,03	97,41	101	100,96	107,82	96,4	99,77	95,33	91,41	91,6

Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Notas:

1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetraivalente (DTP + Hib) substitui as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

Período:2000-2010

Data de elaboração: 13/12/2016  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ







Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

Tetraivalente/DTP

Período:2000-2012








Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

Tetraivalente/DTP

Período:2000-2012



Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico Tetravalente/DTP**

Período:2000-2012

---

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetravalente (DTP + Hib) substitui as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Data de elaboração: 13/12/2016  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ

Atenção à Saúde





Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região**

**Norte e tipo de imunobiológico**

**Poliomielite**

Período:2000-2012









Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**Poliomielite**

Período:2000-2012




## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva

#### Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

#### Poliomielite

Período:2000-2012



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Notas:

1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetravalente (DTP + Hib) substitui as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Data de elaboração: 13/12/2016  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**BCG**

Período:2000-2012







Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**BCG**

Período:2000-2012



## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva


#### Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

#### BCG

Período:2000-2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



#### Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

#### Notas:

1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.

3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetravalente (DTP + Hib) substituiu as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.

4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**BCG**

Período:2000-2012

---

5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Data de elaboração: 13/12/2016  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**Hepatite B**

Período:2000-2012







Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**Hepatite B**

Período:2000-2012





## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva


#### Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

#### Hepatite B

Período:2000-2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.

3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetravalente (DTP + Hib) substituiu as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.

4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.

5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**Hepatite B**

Período:2000-2012

---

Data de elaboração: 13/12/2016  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ





Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**Tríplice viral/Sarampo**

Período:2000-2012







Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

Tríplice viral/Sarampo

Período:2000-2012



## Atenção à Saúde

### Indicadores de atenção preventiva


#### Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico

##### Tríplice viral/Sarampo

Período:2000-2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



Fonte:

Ministério da Saúde - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Base demográfica do Ministério da Saúde

Ministério da Saúde - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Notas:

1. Dados de 2004 a 2010 alterados em relação ao IDB anterior.
2. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
3. A partir de 2003, a vacina contra sarampo foi substituída pela Tríplice Viral (SCR - sarampo, caxumba e rubéola); em crianças de 1 ano e a vacina Tetravalente (DTP + Hib) substitui as vacinas DTP (difteria, coqueluche e tétano) e Hib (Haemophilus influenzae tipo b), sendo que esta havia sido implantada em 1999.
4. Para poliomielite, só estão incluídas as vacinações de rotina.
5. O indicador apresenta valores acima de 100%, tanto por erros de registro das doses aplicadas como pela imprecisão das estimativas utilizadas da população alvo.

Atenção à Saúde

Indicadores de atenção preventiva

**Ind030203RN - Proporção de crianças com esquema vacinal básico completo na idade-alvo, por ano, segundo Brasil, Região Norte, estados da região Norte e tipo de imunobiológico**

**Tríplice viral/Sarampo**

Período:2000-2012

---

Data de elaboração: 13/12/2016  
CEPI-DSS/ ENSP/FIOCRUZ